



מידע בנוגע לבדיקת הידרוסונוגרפיה ± קצף (EX EM FOAM)

- יש לתאם את מועד ביצוע הבדיקה לימים 5-14 לזוט (אפשרי לבצע רק בתום הדימום הזוט). אם המחזורים שלך אינם סדירים – מומלץ שתתייעצי עם המרפאה בנוגע למועד הביצוע המתאים.
- חל איסור לקיים יחסים לא מוגנים מרגע קבלת הזוט ועד ליום הבדיקה!**
- מרבית הנשים עשויות לחוש אי נוחות אגנית-כאב קל בזמן הבדיקה ומספר שעות אחריה, לכן אני ממליצה ליטול משכך כאבים שעה-שעתיים לפני מועד ביצוע הבדיקה (יש לוודא טרם הנטילה שאין רגישות לתרופה ושהיא נלקחת במינון המתאים ולפי הנחיות היצרן בעלון התרופה)
- אפשר ורצוי להגיע לבדיקה עם מלווה (:)
- יש לרכוש מבעוד מועד אנטיביוטיקה לפי המרשם שתקבלי מהמרפאה וליטול בהתאם להנחיות שתקבלי, שעה לפני ביצוע הבדיקה. אם יהיה צורך בהמשך טיפול אנטיביוטי אחרי הבדיקה – תקבלי מהצוות הנחיות מדויקות אודות המינון ומשך הנטילה.
- התוצאות מתקבלות מיד עם תום הבדיקה.
- בימים שלאחר ביצוע הבדיקה, במקרה של הופעת כאבי בטן חריגים, דימום חריג, או חום מעל 38, יש לפנות לבדיקת רופא ולעדכן את המרפאה.



בהצלחה (:)